

Instrukcja użycia

Tezspire 210 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce tezepelumab

„Instrukcja użycia” zawiera informacje o tym, jak wstrzykiwać lek Tezspire.

Przed użyciem przez pacjenta ampułko-strzykawki z lekiem Tezspire lekarz powinien zademonstrować jej prawidłowe użycie pacjentowi lub opiekunowi pacjenta.

Należy przeczytać tę „Instrukcję użycia” przed rozpoczęciem stosowania leku Tezspire w ampułko-strzykawce i każdorazowo przed kolejnym wstrzyknięciem. Mogą pojawić się nowe informacje. Podane tu informacje nie powinny zastępować rozmowy z lekarzem o stanie zdrowia pacjenta i leczeniu.

Jeśli pacjent lub opiekun pacjenta ma jakiegokolwiek pytania, należy porozmawiać z lekarzem.

Ważne informacje, z którymi należy zapoznać się przed wstrzyknięciem leku Tezspire

Lek Tezspire należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C w zewnętrznym pudełku tekturowym do czasu, gdy pacjent będzie gotowy do wykonania wstrzyknięcia. Lek Tezspire można przechowywać w temperaturze pokojowej od 20°C do 25°C w zewnętrznym pudełku tekturowym przez maksymalnie 30 dni.

Po osiągnięciu przez lek Tezspire temperatury pokojowej **nie** wkładać go ponownie do lodówki.

Wyrzucić (usunąć) lek Tezspire, który był przechowywany w temperaturze pokojowej dłużej niż przez 30 dni (patrz krok 10).

Nie używać leku Tezspire w ampułko-strzykawce, jeśli:

- został zamrożony
- został upuszczony lub uszkodzony
- zabezpieczenie na pudełku tekturowym zostało przerwane
- upłynął termin ważności (EXP).

Nie wstrząsać ampułko-strzykawki.

Nie udostępniać ampułko-strzykawki innym osobom ani nie używać jej więcej niż 1 raz.

Nie narażać leku Tezspire w ampułko-strzykawce na działanie wysokich temperatur.

Jeśli wystąpi którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, należy wyrzucić strzykawkę do pojemnika odpornego na przebicie (na ostre odpady) i użyć nowej ampułko-strzykawki z lekiem Tezspire.

Każda ampułko-strzykawka z lekiem Tezspire zawiera 1 dawkę leku Tezspire, którą można użyć tylko 1 raz.


Lek Tezspire w ampułko-strzykawce i wszystkie leki należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek Tezspire podaje się tylko we wstrzyknięciu pod skórę (podskórnie).

Lek Tezspire w ampułko-strzykawce

Nie zdejmować osłonki z igły przed wykonaniem kroku 7 tej instrukcji, gdy pacjent będzie już gotowy do wstrzyknięcia leku Tezspire.


Nie dotykać klipsów uruchamiających zabezpieczenie igły. Dzięki temu nie dojdzie do zbyt wczesnego uruchomienia urządzenia zabezpieczającego (zabezpieczenia igły).



Przygotowanie do wstrzyknięcia leku Tezspire

Krok 1 – Zgromadzić potrzebne materiały

- 1 ampulko-strzykawka z lekiem Tezspire wyjęta z lodówki
- 1 wacik nasączony alkoholem
- 1 wacik bawełniany lub gaza
- 1 mały plaster (opcjonalnie)
- 1 pojemnik odporny na przekłucie (na ostre odpady). Instrukcje jak bezpiecznie wyrzucać (usuwać) zużytą ampulko-strzykawkę z lekiem Tezspire, patrz krok 10.



Ampulko-strzykawka



Wacik nasączony alkoholem



Wacik bawełniany lub gaza



Plaster



Pojemnik na ostre odpady

Krok 2 – Przygotować ampulko-strzykawkę z lekiem Tezpire do użycia

Pozwolić, aby lek Tezpire osiągnął temperaturę pokojową wynoszącą od 20°C do 25°C przez około 60 minut lub dłużej (przez maksymalnie 30 dni) przed wykonaniem wstrzyknięcia.

Przechowywać ampulko-strzykawkę w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem.

Nie ogrzewać ampulko-strzykawki w żaden inny sposób. Na przykład **nie** ogrzewać jej w kuchence mikrofalowej ani w gorącej wodzie, nie narażać jej na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani nie umieszczać ampulko-strzykawki w pobliżu źródeł ciepła.


Nie wkładać leku Tezpire z powrotem do lodówki po tym, jak lek osiągnie temperaturę pokojową. Wyrzucić (usunąć) lek Tezpire, który był przechowywany w temperaturze pokojowej dłużej niż przez 30 dni.

Nie zdejmować osłony z igły przed krokiem 7 tej instrukcji.



Krok 3 – Wyjąć ampulko-strzykawkę

Chwycić trzon strzykawki, aby wyjąć ampulko-strzykawkę z tekturowego pudełka. **Nie** chwytąć ampulko-strzykawki za tłok.



Trzon strzykawki

Krok 4 – Sprawdzić ampulko-strzykawkę


Sprawdzić, czy ampulko-strzykawka nie jest uszkodzona. Nie stosować ampulko-strzykawki, jeśli ampulko-strzykawka jest uszkodzona.

Sprawdzić termin ważności na ampulko-strzykawce. **Nie** używać ampulko-strzykawki po upływie terminu ważności.

Obejrzeć roztwór przez okienko kontrolne. Roztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny do jasnożółtego.

Nie wstrzykiwać leku Tezpire, jeśli roztwór jest mętny, przebarwiony lub zawiera duże cząstki.

W roztworze mogą być widoczne małe pęcherzyki powietrza. Jest to normalne zjawisko. Nie ma konieczności podejmowania działań w związku z tym.



Termin ważności

Wstrzykiwanie leku Tezpire

Krok 5 – Wybrać miejsce wstrzyknięcia


Jeśli pacjent sam wykonuje wstrzyknięcie, **zalecanym miejscem wstrzyknięcia** jest przednia część uda lub dolna część brzucha (jamy brzusznej). **Nie** wykonywać samodzielnie wstrzyknięcia w ramię.

Opiekun może wykonać wstrzyknięcie w górną część ramienia, udo lub brzuch.

Dla każdego wstrzyknięcia wybrać inne miejsce, które znajduje się w odległości co najmniej 3 cm od miejsca ostatniego wstrzyknięcia.

Nie wstrzykiwać:

- w miejsca znajdujące się w promieniu 5 cm od pępka
- w miejsca, w których skóra jest bolesna, zasiniona, łuszczy się lub jest stwardniała
- w blizny lub uszkodzoną skórę
- przez ubranie.



Krok 6 – Umyć ręce i oczyścić miejsce wstrzyknięcia


Dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

Oczyścić miejsce wstrzyknięcia wacikiem nasączonym alkoholem wykonując okrężne ruchy.

Począć, aż miejsce wyschnie.

Nie dotykać oczyszczonego miejsca przed wstrzyknięciem.

Nie wachlować oczyszczonego miejsca ani nie dmuchać na nie.



Krok 7 – Zdjąć osłonę igły

Nie zdejmować osłony igły, dopóki pacjent nie będzie gotowy do wykonania wstrzyknięcia.

Trzymać trzon strzykawki jedną ręką i ostrożnie, nie przekręcając, pociągnąć osłonę igły drugą ręką.


Nie trzymać za tłok ani za główkę tłoka podczas zdejmowania osłony igły.

Położyć osłonę igły z boku, a później wyrzucić.

Na końcu igły może być widoczna kropla roztworu. To normalne.

Nie dotykać igły ani nie pozwolić, aby igła dotknęła jakiegokolwiek powierzchni.

Nie nakładać ponownie osłony igły na strzykawkę.



Krok 8 – Wstrzyknąć lek Tezpire



Trzymać ampułko-strzykawkę jedną ręką, tak jak to pokazano na rysunku.

Drugą ręką delikatnie złapać skórę i trzymać fałd skóry, w który wykonane zostanie wstrzyknięcie. Dzięki temu skóra będzie usztywniona.

Nie wciskać główki tłoka, dopóki igła nie zostanie wprowadzona w skórę.


Nigdy nie odciągać główki tłoka.

Wstrzyknąć lek Tezpire wykonując kroki przedstawione na rysunkach **a**, **b** i **c**.




Pod kątem 45 stopni, wprowadzić całą igłę w fałd skóry.

Nie próbować zmieniać pozycji ampułko-strzykawki po wprowadzeniu igły w skórę.



Używając kciuka nacisnąć na główkę tłoka.

Wcisnąć główkę tłoka do końca, aby mieć pewność, że wstrzyknięto całą objętość leku.




Trzymać kciuk na główce tłoka, naciskając ją podczas wyjmowania igły ze skóry. Powoli zwalniać tłok, aż zabezpieczenie igły zakryje igłę.

Krok 9 – Sprawdzić miejsce wstrzyknięcia

W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielka ilość krwi lub płynu. Jest to normalne zjawisko.

Delikatnie uciskać skórę przez wacik bawełniany lub gazę do czasu ustania krwawienia.

Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia. W razie potrzeby zakleić miejsce wstrzyknięcia małym plastrem.




Usuwanie leku Tezspire

Krok 10 – Usunąć zużytą ampulko-strzykawkę w bezpieczny sposób

Każda ampulko-strzykawka zawiera pojedynczą dawkę leku Tezspire i **nie może być użyta ponownie**. **Nie** nakładać ponownie osłony igły na ampulko-strzykawkę.

Włożyć zużytą ampulko-strzykawkę i osłonę igły do **pojemnika na ostre odpady** natychmiast po użyciu. Inne zużyte przedmioty umieścić w domowym pojemniku na odpadki.

Nie wyrzucać ampulko-strzykawki do domowego pojemnika na odpadki.



Wskazówki dotyczące usuwania

Pełen pojemnik należy usunąć zgodnie ze wskazówkami podanymi przez lekarza lub farmaceutę.

Nie wyrzucać zużytego pojemnika na ostre odpady do domowego pojemnika na odpadki, chyba że lokalne przepisy na to pozwalają.

Nie poddawać recyklingowi zużytych pojemników na ostre odpady.